




Alltech®

MANEJO DE SALUD INTESTINAL

Establecer un desarrollo intestinal saludable en las terneras es esencial para construir la base del rendimiento y la rentabilidad en futuros animales de reemplazo. Los terneros sanos comerán y crecerán de manera más eficiente, asegurando un futuro de alto rendimiento. El programa de Manejo de Salud Intestinal de Alltech® se concentra en promover las buenas bacterias intestinales, la construcción de defensas más fuertes y la maximización del crecimiento y rendimiento.



ACID-PAK 4-WAY 2X®

Acid-Pak 4-Way 2X es una solución soluble que está diseñada para reducir el pH del agua con el fin de mantener las condiciones óptimas para la digestión en el estómago e intestino delgado.

La salud en terneros es clave.

Un bajo pH ayuda en:

- Integridad y estructura del tracto gastrointestinal.
- Estado inmune.
- Un ambiente hostil para bacterias patógenas (por ejemplo, E. coli y Salmonella.)

ACID-PAK 4-Way 2X ayuda a:

- El establecimiento de una microflora favorable.
- Actividad enzimática para promover una digestión eficiente.
- El mantenimiento de un balance normal electrolítico.

ACID-PAK 4-WAY 2X incluye:

Probióticos: Las bacterias beneficiosas productoras de ácido láctico ayudan en la construcción y soporte del desarrollo de una microflora saludable en el tracto gastro intestinal.

Acidificantes orgánicos: El ácido cítrico y el ácido acético reducen el pH y lo mantienen bajo durante más tiempo.

Enzimas: La proteasa, celulasa y amilasa ayudan a descomponer la proteína, fibra y almidón.

Electrolitos: Ayuda a que el animal se mantenga hidratado, especialmente en momentos de estrés por calor o por enfermedad.



DIARREA



Causas comunes de diarrea neonatal (Nacimiento a cuatro semanas de edad)

Bacteriana:

- E. coli
- Salmonella
- Clostridium perfringens

Viral:

- Coronavirus
- Rotavirus
- Diarrea viral bovina

Parasítica:


- Cryptosporidiosis
- Coccidiosis

SIGNOS DE DIARREA NEONATAL / BECERROS

(Nacimiento a cuatro meses de edad)

- Estiércol suelto, acuoso o sanguinolento
- Actitud opaca y depresiva
- Deshidratación (ojos hundidos)
- Fracaso en beber o amamantar
- Muerte repentina

¿CUÁNDO MUEREN LOS TERNEROS?



62%

DE TODAS LAS MUERTES DE TERNEROS OCURREN A LOS 21 DÍAS DE EDAD.


USDA: APHIS Dairy 96 and Thomas, 2006

SOLUCIONES PARA LA DIARREA

- Continuar alimentando leche dos veces al día.
- Agregue dos o tres tomas de electrolitos sobre la alimentación de leche.
- Reevaluar el régimen de alimentación con el uso de electrolitos y probióticos.

Si las terneras están mostrando síntomas severos y no beben, es necesario llamar al veterinario para tratar a los terneros con fluidos intravenosos. La alimentación forzada puede resultar en neumonía, ya que las becerras muy enfermas no pueden tragar adecuadamente. Asegúrese que las terneras afectadas estén abrigadas y secas.

¿POR QUÉ SE MUEREN LOS TERNEROS?



Los terneros son el futuro de su negocio; su alternativa es Acid-Pak 4-Way 2X®.

